

738

66

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
I 1	H 1 1,00795 водород	Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева						He 2 4,002602 гелий			
II 2	Li 3 6,9412 литий	Be 4 9,01218 бериллий	B 5 10,812 бор	C 6 12,0108 углерод	N 7 14,0067 азот	O 8 15,9994 кислород	F 9 18,99840 фтор	Ne 10 20,179 неон			
III 3	Na 11 22,98977 натрий	Mg 12 24,305 магний	Al 13 26,98154 алюминий	Si 14 28,086 кремний	P 15 30,97376 фосфор	S 16 32,06 серпа	Cl 17 35,453 хлор	Ar 18 39,948 аргон			
IV 4	K 19 39,0983 калий	Ca 20 40,08 кальций	Sc 21 44,9559 скандий	Ti 22 47,90 титан	V 23 50,9415 ванадий	Cr 24 51,996 хром	Mn 25 54,9380 марганец	Fe 26 55,847 железо	Co 27 58,9332 cobальт	Ni 28 58,70 никель	
5	Cu 29 63,546 медь	Zn 30 65,38 цинк	Ga 31 69,72 галлий	Ge 32 72,59 германий	As 33 74,9216 мышьяк	Se 34 78,96 селен	Br 35 79,904 бром	Kr 36 83,80 криптон			
V 6	Rb 37 85,4678 рубидий	Sr 38 87,62 стронций	Y 39 88,9059 иттрий	Zr 40 91,22 цирконий	Nb 41 92,9064 ниобий	Mo 42 95,94 молибден	Tc 43 98,9062 технеций	Ru 44 101,07 рутений	Rh 45 102,9055 родий	Pd 46 106,4 палладий	
7	Ag 47 107,868 серебро	Cd 48 112,41 кадмий	In 49 114,82 индий	Sn 50 118,69 олово	Sb 51 121,75 сурьма	Te 52 127,60 теллур	I 53 126,9045 иод	Xe 54 131,30 ксенон			
VI 8	Cs 55 132,9054 цезий	Ba 56 137,33 барий	La 57 138,9 лантан x	Hf 72 178,49 гафний	Ta 73 180,9479 тантал	W 74 183,85 вольфрам	Re 75 186,207 рений	Os 76 190,2 осмий	Ir 77 192,22 иридий	Pt 78 195,09 платина	
9	Au 79 196,9665 золото	Hg 80 200,59 ртуть	Tl 81 204,37 таллий	Pb 82 208,9 свинец	Bi 83 [209] висмут	Po 84 [210] полоний	At 85 [210] астат	Rn 86 [222] радон			
VII 10	Fr 87 [223] франций	Ra 88 [226] радий	Ac 89 [227] актиний xx	Rf 104 [261] резерфордий	Db 105 [262] дубний	Sg 106 [266] сиборгий	Bh 107 [269] борий	Hs 108 [269] хассий	Mt 109 [268] мейтнерий	Ds 110 [271] дармштадтий	
11	Rg 111 [272] рентгений	Cn 112 [285] копериций		Fl 114 [289] флеровий		115	Lv 116 [293] ливерморий		117	118	
	x лантаноиды										

Ce 58 140,1 церий	Pr 59 140,9 празеодим	Nd 60 144,2 неодим	Pm 61 [145] прометий	Sm 62 150,4 самарий	Eu 63 151,9 европий	Gd 64 157,3 гадолиний	Tb 65 158,9 тербий	Dy 66 162,5 диспрозий	No 67 164,9 гольмий	Er 68 167,3 эрбий	Tm 69 168,9 тулий	Yb 70 173,0 иттербий	Lu 71 174,9 лютеций
Th 90 232,0 торий	Pa 91 231,0 протактиний	U 92 238,0 уран	Np 93 [237] нептуний	Pu 94 [244] плутоний	Am 95 [243] америкий	Cm 96 [247] корий	Bk 97 [247] берклий	Cf 98 [251] калифорний	Es 99 [252] эйнштейний	Fm 100 [257] фермий	Md 101 [258] менделевий	No 102 [259] нобелий	Lr 103 [262] лоуренсий

Ряд активности металлов / электрический ряд напряжений
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pd Pt Au

активность металлов уменьшается

Растворимость кислот, солей и оснований в воде

Ионы	H ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Na ⁺	Ag ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	Cu ²⁺	Hg ²⁺	Hg ₂ ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	
OH ⁻	P	P	P	P	-	P	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	-	H	H	H	H
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	P	P
F ⁻	P	P	P	P	P	M	H	M	P	H	P	P	M	P	-	M	M	H	M	M	M
Cl ⁻	P	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	M	P	P	H	P	P	P	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	M	P	M	H	P	P	P	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	H	-	H	H	P	-	P	P	P
S ²⁻	P	P	P	P	H	-	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	-
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	M	M	M	M	H	M	H	-	H	-	-	-	M	-	-	-	-
SO ₄ ²⁻	P	P	P	P	M	H	M	P	P	P	P	H	P	R	M	P	P	P	P	P	P
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	-	H	-	-	H	H	-	-	-	-
SiO ₃ ²⁻	H	-	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	-	H	-	-	H	-	-	-	-
PO ₄ ³⁻	P	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	P	P	P	P	P

P — растворимое (больше 10 г на 1000 г воды)
Н — нерастворимое (меньше 0,01 г на 1000 г воды)

M — малорастворимое (от 10 г до 0,01 г на 1000 г воды)
— вещество разлагается водой или не существует

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 2018–2019

Заключительный этап

Предмет (комплекс предметов) Олимпиады

ХИМИЯ (10 КЛАСС)

Город, в котором проводится Олимпиада Коломна

Дата 14 03 2019

ВАРИАНТ 5

Задача 1. «Старый реактив»

(20 баллов)

Студент Никита нашел на полке 2 склянки с неизвестными растворами без крышки. Он спросил у лаборанта, что это за реагенты, а тот ответил, что в точности не помнит, помнит только, что в обеих банках находятся растворы одной и той же соли щелочного металла с массовой долей катиона 55,2% и одна из банок стоит здесь довольно давно, а другая недавно. В распоряжении Никиты оказались только раствор щелочи (NaOH), а также баритовая вода и соляная кислота. При добавлении к неизвестным растворам щелочи видимых изменений не произошло. При добавлении кислоты к давно стоящему раствору выделился газ без цвета и запаха, а при добавлении к свежему раствору — газ не выделился. Никита очень удивился и провел еще один эксперимент. Он отобрал по 100 мл каждого из растворов и упарил их. Масса твердого остатка в первом случае оказалась 21,84 г, а во втором 14,84 г. Твердые остатки Никита снова растворил и обработал растворы баритовой водой. В результате в первом случае выпало 35,00 г осадка, а во втором 21,14 г. Остатки после упаривания растворов Никита прокалил, в результате масса одного уменьшилась на 0,63 г, а второго не изменилась. Выпавшие после обработки баритовой водой осадки Никита так же прокалил, в результате масса одного уменьшилась на 1,54 г, а второго не изменилась. Предложите возможный состав соли. Определите молярные концентрации и массовые доли веществ в исходных растворах (плотность растворов примите равной 1 г/мл).

Na₂P₂O₇

Задача 2. «Химические источники тока»

(20 баллов)

На данный момент в различных электронных устройствах в качестве элементов питания используются химические источники тока (батареи и аккумуляторы), в которых энергия химических реакций превращается в электрическую энергию. Принцип работы таких источников тока основан на ОВР, протекающих внутри батареи (аккумулятора), при этом электроны от восстановителя к окислителю переносятся через внешнюю электрическую цепь.

Юный инженер Боря создал

выделение газов, а для анализа полученного раствора Боря обратился к другу химику. Тот смог сказать лишь, что полученный раствор является раствором сильного основания, с массовой долей вещества в растворе 16,67 %.

Газ, образовавшийся в ходе анодного процесса, Боря пропустил через полученный раствор, доведенный до кипения. После охлаждения раствора Боря собрал образовавшийся белый кристаллический осадок и в дальнейшем использовал его в работе батареи.

Для получения второго компонента батареи Боря использовал завалывшиеся в кладовке гвозди, причем он заметил, что они хорошо притягиваются лежащим по соседству магнитом. Эти гвозди Боря поместил в раствор хлорного железа, которое позаимствовал у отца-радиолюбителя. Полученный раствор был отфильтрован от нерастворимых примесей и использован в работе батареи.

Определите состав вещества АБ. Ответ подтвердите расчетами.

Запишите уравнения всех описанных реакций.

Запишите молекулярное уравнение реакции, лежащей в основе работы батареи. Запишите ионно-электронные уравнения процессов окисления и восстановления, лежащих в основе реакции, протекающей в батарее.

На какое время работы устройства хватит полученного из АБ вещества, если известно, что средняя сила тока в нем составляет $0,25\text{A}$? (заряд электрона $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}\text{Кл}$).

Считайте, что выходы всех представленных реакций равны 100%.

Задача 3.

(20 баллов)

При монобромировании пропана на свету образуется смесь производных. Известно, что при стандартных условиях соотношение относительных скоростей замещения у первичного, вторичного и третичного атомов углерода составляет 1:80,0:1000,0. Определите мольные доли компонентов в газовой и жидкой фазах при 25 и 250 °C, если известно, что исходные вещества прореагировали полностью, стандартные теплоты сгорания газообразных н-пропилбромида и изопропилбромида составляют 1939 и 1930 кДж/моль, а стандартные энтропии этих веществ S° практически одинаковы.

Испарением органических жидкостей и растворимостью бромоводорода в них при стандартных условиях, а также термическим разложением бромоводорода пренебречь.

Для справки: константа равновесия реакции связана с ее термодинамическими характеристиками уравнением:

$$\ln K = -\Delta_f H^\circ / RT + \Delta_f S^\circ / R$$

Задача 4.

(20 баллов)



0,1

Для качественного анализа содержащей некоторое количество крезола смеси сложных эфиров X_0 , Y_1 и Y_2 , образованных одним спиртом и двумя разными одноосновными карбоновыми кислотами, провели следующие эксперименты. Порцию такой смеси массой 38,8 г обработали 16% раствором гидроксида натрия, на количественное взаимодействие пошло 100 г раствора щелочи. Такую же порцию исходной смеси разделили на две равные части, первую обработали избытком бромной воды и получили 34,5 г осадка, а вторую обработали избытком реактива Толленса, выпавший осадок отфильтровали и высушили, его масса составила 21,05 г. Обработка этого осадка избытком соляной кислоты уменьшает его массу на 14,61%. Установите структуры эфиров X и Y и напишите уравнения описанных реакций.




Задача 5.

(20 баллов)

Расшифруйте цепочку превращений, если известно, что 5,4 г. соединения **B** способно прореагировать с 16,2 г бромоводорода с образованием дибромида. Предложите механизм образования **E** из **D**.





$$5,6 = 24x \quad 14,9446 = 24x - 143,5x \\ x = 2,333 \dots$$



$$\frac{8.8x + 112(0.7-x)}{0.4} = g\%$$

$$88x - 112x = 38.8 - 44.8$$

$$0,25 \sim 0 \overset{9}{\underset{88}{\rightarrow}} \quad 88x - 112x = 36 \\ 24x = 6 \\ x = 0,25$$



$$W(B) = \frac{M(C_{H^6})}{M(H^2)} = \frac{5h^2}{5h^2} = 1$$

57



$$V(\alpha_2) = 0,11 \text{ nsec} \quad \checkmark$$

$$V(k\alpha\text{CO}_3) = 0,034 \text{ nsec}$$

$$N(e^-) = 0,222 \cdot 10^{123}$$



$$q = N(e^-), q_e = 0,355 \cdot 10^4$$

$$t = \frac{q}{A} = 11200 \text{ sec} = \underbrace{3,95}_{\text{nsec}} \text{ nsec}$$

N1

Rachlopijne b-lø - K_3PO_4 (ue(K) = 55,2%)

$$V(k_3\text{PO}_4) = 0,04 \text{ nsec}$$



$$V(\text{H}_2\text{O}) = 0,035 \text{ nsec}$$

$$V(\text{BaCO}_3) = 0,04 \text{ nsec}$$



$$V(\text{CO}_2) = 0,035 \text{ nsec}$$

$$C(\text{K}_3\text{PO}_4) \text{ eklampende} = 0,4 \frac{\text{nsec}}{\text{c}}$$

$$C(K_2CO_3) = 0,35 \frac{\text{моль}}{\text{л}} \quad \text{чистота}$$




$$C(K_2HPO_4)_{\text{стекло}} = 0,7 \frac{\text{моль}}{\text{л}}$$

Плавка в стекле раствора могут привести $NaKSiO_3$ из стекла.

$$NaKSiO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow NaOH + KOH + BaSiO_3 \downarrow$$


$$C(NaKSiO_3)_{\text{стекло}} = 0,35 \frac{\text{моль}}{\text{л}}$$

NH



$$\frac{1}{2}(R-C\equiv CH) + \frac{1}{2}(R'-C\overset{O}{\underset{H}{\asymp}}) = 0,45$$

~~М(R-C≡CH)~~



$$M(R-) = x$$



$$\frac{1}{2}(R'-C\overset{O}{\underset{H}{\asymp}}) = y$$

14

$$2y \cdot (x + 29)(108 - 2y)(x + 43) = 28$$

$$2y \cdot 108 + (0,45 - y)(108 + x + 43) = 21,05$$

$$2y \cdot 108 + (0,45 - y)(108 + x + 43) = \frac{2y \cdot 108 + (0,45y)(108 + 35)}{0,8539}$$



~~These sugars are called pectin, no cellulose~~