

99



2

57

**ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ
2018–2019**

Заключительный этап

Предмет (комплекс предметов) Олимпиады

ХИМИЯ (9 КЛАСС)

Город, в котором проводится Олимпиада

*Череповец*Дата 16.03.2019**ВАРИАНТ 1****Задача 1. Непривычные молекулы.**


(20 баллов)

Элемент X образует с кислородом несколько бинарных соединений, наиболее известными являются А (массовая доля элемента X, $\omega_X = 50,0\%$) и В ($\omega_X = 40,0\%$). Однако, существуют и другие бинарные соединения элемента X с кислородом, например, С ($\omega_X = 33,3\%$) и D ($\omega_X = 94,12\%$). Установите состав веществ А, В, С и D, нарисуйте их структурные формулы. Опишите химические свойства этих бинарных соединений. Какие еще бинарные соединения элемента X с кислородом Вам известны?

Задача 2. Реакции элемента Э.

(20 баллов)

Реакции некоторого простого вещества Э показаны на схеме. Предложите два простых вещества, удовлетворяющих указанной схеме, а также напишите формулы соответствующих им соединений А, Б, В. Напишите уравнения реакций, укажите условия их проведения. Что произойдет, если А растворить а) в воде; б) в водном растворе щелочи; в) в кислоте? Напишите уравнения возможных реакций.

**Задача 3. «Нано»**

(20 баллов)

Как известно, нанотехнологии являются одним из наиболее быстро развивающихся направлений науки и техники. При этом все большее внимание уделяется синтезу и исследованию сферических биметаллических “core-shell” наночастиц, т.е., наночастиц, у которых внутреннее ядро состоит из атомов одного, а внешняя оболочка – из атомов другого металла.

А) Что такое наночастица?

Б) Оцените размер сферической наночастицы, ядро которой состоит из 80 атомов золота, а оболочка – из 100 атомов серебра. Плотность серебра примите равной $10500 \text{ кг}/\text{м}^3$, а плотность золота – $19320 \text{ кг}/\text{м}^3$.

В) Предложите способ синтеза суспензии, содержащей такие наночастицы, с использованием в качестве исходных веществ тетрахлороаурата натрия, ляписа, формиата натрия, воды.

Для справки: объем шара связан с радиусом согласно соотношению: $V = 4/3\pi r^3$

I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I	1	H 1 1,00795 водород	Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева					
II	2	Li 3 6,9412 литий	Be 4 9,01218 бериллий	B 5 10,812 бор	C 6 12,0108 углерод	N 7 14,0067 азот	O 8 15,9994 кислород	F 9 18,99840 фтор
III	3	Na 11 22,98977 натрий	Mg 12 24,305 магний	Al 13 26,98154 алюминий	Si 14 28,086 кремний	P 15 30,97376 фосфор	S 16 32,06 серпа	Cl 17 35,453 хлор
IV	4	K 19 39,0983 калий	Ca 20 40,08 кальций	Sc 21 44,9559 скандий	Ti 22 47,90 титан	V 23 50,9415 ванадий	Cr 24 51,996 хром	Mn 25 54,9380 марганец
	5	Cu 29 63,546 медь	Zn 30 65,38 цинк	Ga 31 69,72 галлий	Ge 32 72,59 германий	As 33 74,9216 мышьяк	Se 34 78,96 селен	Br 35 79,904 брон
V	6	Rb 37 85,4678 рубидий	Sr 38 87,62 стронций	Y 39 88,9059 иттрий	Zr 40 91,22 цирконий	Nb 41 92,9064 ниобий	Mo 42 95,94 молибден	Tc 43 98,9062 технеций
	7	Ag 47 107,868 серебро	Cd 48 112,41 cadмий	In 49 114,82 индий	Sn 50 118,69 олово	Sb 51 121,75 сурьма	Te 52 127,60 теллур	I 53 126,9045 iod
VI	8	Cs 55 132,9054 цезий	Ba 56 137,33 барий	La 57 138,9 лантан ×	Hf 72 178,49 гафний	Ta 73 180,9479 тантал	W 74 183,85 вольфрам	Re 75 186,207 рений
	9	Au 79 196,9665 золото	Hg 80 200,59 ртуть	Tl 81 204,37 таллий	Pb 82 207,2 свинец	Bi 83 208,9 висмут	Po 84 [209] полоний	At 85 [210] астат
VII	10	Fr 87 [223] франций	Ra 88 [226] радий	Ac 89 [227] актиний ××	Rf 104 [261] резерфордий	Db 105 [262] дубний	Sg 106 [266] сиборгий	Bh 107 [269] борий
	11	Rg 111 [272] рентгений	Cn 112 [285] коперниций	113	Fl 114 [289] флеровий	115	Lv 116 [293] ливерморий	117

Ce 58 140,1 церий	Pr 59 140,9 празеодим	Nd 60 144,2 неодим	Pm 61 [145] прометий	Sm 62 150,4 самарий	Eu 63 151,9 европий	Gd 64 157,3 гадолиний	Tb 65 158,9 тербий	Dy 66 162,5 диспрозий	No 67 164,9 гольмий	Er 68 167,3 эрбий	Tm 69 168,9 тулий	Yb 70 173,0 иттербий	Lu 71 174,9 лютеций
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

xx актиниды

Th 90 232,0 торий	Pa 91 231,0 протактиний	U 92 238,0 уран	Np 93 [237] нептуний	Pu 94 [244] плутоний	Am 95 [243] америций	Cm 96 [247] корий	Bk 97 [247] берклий	Cf 98 [251] калифорний	Es 99 [252] зинштейний	Fm 100 [257] фермий	Md 101 [258] менделевий	No 102 [259] нобелий	Lr 103 [262] лоуренсий
-------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------

Ряд активности металлов / электрический ряд напряжений
 Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pd Pt Au

активность металлов уменьшается →

Растворимость кислот, солей и оснований в воде

Ионы	H ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Na ⁺	Ag ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	Cu ²⁺	Hg ²⁺	Hg ₂ ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	
OH ⁻	P	P	P	—	P	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	—	P	P	P	P	P
F ⁻	P	P	P	P	M	H	M	P	H	P	P	M	P	—	M	M	H	M	M	M	M
Cl ⁻	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	M	P	P	H	P	P	P	P	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	P	M	P	M	H	P	P	P	P	P
I ⁻	P	P	P	P	H	P	P	P	P	P	P	P	H	—	H	H	P	—	P	P	P
S ²⁻	P	P	P	P	H	—	—	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	—	—	—	—
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	M	M	M	M'	H	M	H	—	H	—	—	M	—	—	—	—	—
SO ₄ ²⁻	P	P	P	P	M	H	M	P	P	P	P	H	P	P	M	P	P	P	P	P	P
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	H	H	H	H	H	—	—	H	—	—	H	H	—	—	—	—	—
SiO ₃ ²⁻	H	—	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	—	—	—	—
PO ₄ ³⁻	P	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
CH ₃ COO ⁻	P	P																			

Задача 4. «Минерал»

(20 баллов)




При прокаливании бесцветного природного минерала его масса уменьшается на 21,73%, а выделяющийся продукт полностью поглощается концентрированной серной кислотой. Проба минерала окрашивает пламя в фиолетовый цвет. Обработка минерала концентрированной серной кислотой приводит к выделению газа, хорошо растворимого в воде и не вызывающего помутнения известковой воды. Минерал полностью растворяется в воде, образуя бесцветный раствор. При действии на раствор минерала избытком растворов хлорида бария и нитрата серебра выпадают нерастворимые в кислотах белые осадки, массы которых соотносятся как 1.6 : 1, а при действии раствора щелочи выпадает белый осадок, растворимый в кислотах, но не в избытке щелочи. При прокаливании этого осадка его масса уменьшается на 31,03%. Определите состав минерала, приведите уравнения всех указанных в условии задачи реакций. Как называется этот минерал?

Задача 5. «Старый реагент»

(20 баллов)


Студент Никита нашел на полке 2 склянки с неизвестными растворами без крышки. Он спросил у лаборанта, что это за реагенты, а тот ответил, что в точности не помнит, помнит только, что в обеих банках находятся растворы одной и той же соли щелочного металла с массовой долей катиона 42.1% и одна из банок стоит здесь довольно давно, а другая недавно. В распоряжении Никиты оказались только раствор щелочи (NaOH), а также известковая вода и соляная кислота. При добавлении к неизвестным растворам щелочи видимых изменений не произошло. При добавлении кислоты к давно стоявшему раствору выделился газ без цвета и запаха, а при добавлении к свежему раствору – газ не выделился. Никита очень удивился и провел еще один эксперимент. Он отобрал по 100 мл каждого из растворов и упарил их. Масса твердого остатка в первом случае оказалась 4.96 г, а во втором 3.28 г. Твердые остатки Никита снова растворил и обработал растворы известковой водой. В результате в первом случае выпало 5.10 г осадка, а во втором 3.10 г. Остатки после упаривания растворов Никита прокалил, в результате масса одного уменьшилась на 0.18 г, а второго не изменилась. Выпавшие после обработки известковой водой осадки Никита так же прокалил, в результате масса одного уменьшилась на 0.88 г, а второго не изменилась. Предложите возможный состав соли. Определите молярные концентрации и массовые доли веществ в исходных растворах (плотность растворов примите равной 1 г/мл).

N1





12







N2



Решение




Аналогично для Pt



N3



Карбонат – разница, которой равен исходный и конечный




$$V_0 = V(\text{Au}) + V(\text{Ag}) = 3,06359 \cdot 10^{-21} \text{ см}^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad R = 9 \cdot 10^{-8} \text{ см} = 9 \cdot 10^{-10} \text{ м.}$$

~~Найдено, что вода, в которой растворены золото и серебро, имеет температуру 20°C, а плотность 1,000 g/cm³.~~



Q1



Degre of Mg(OH)_x - partically & measure: n.p. & excess

$$\begin{aligned} I &= x \\ I &= h \quad \cancel{MgO} \\ 0.33x &= 0.29,69 \end{aligned}$$

$$\frac{I}{0.33x} = \frac{194.5 + 180}{194.5 + 180 + 246.5 + 180} \approx 0.48$$

Degre of BaSO₄ & Cu (1,6:1)

measured molar - H

NH



measured

6 1 смеше - смес хабокта менова и
6 2 - носово

$$\Delta M_1 = 0,88\text{r} \quad \Delta M_2 = M(1\text{cm}) \quad \Delta M = 0,18\text{r} \quad \Delta M = M(4\text{cm})$$

$$\Rightarrow M(CaCO_3) = 0,02\text{ mol}$$

$$\Rightarrow M(CaCO_3) = 2\text{r}$$

$$M_{1,96\text{r}} - смесь \quad 3,28 - коток,$$

$$M_{1,96\text{r}} - 5,1\text{r} - 0,88\text{r} = M_{1,22\text{r}} - M_{1,96\text{r}} \text{ нет } \delta \text{ по Ca?}$$

$$M_{1,22\text{r}} = CaO + CaA$$

$$M + CaCO_3 = \frac{5}{2}M + Ca(OH)_2 \quad \text{однако}$$

$$M + Ca(OH)_2 = CaX + NaOH + CO_2$$

$$M_{1,1\text{r}} = 2\text{r} + M(CaX) \quad M(CaX) \approx 3,1\text{r}$$

$$\Rightarrow M(B) \text{ 6 смеси } \rho = \rho = M(B) \approx 3,28\text{r}$$

$$\Rightarrow M(CaCO_3) = M_{1,96\text{r}} - 3,28\text{r} = 1,68\text{r}$$

$$\Rightarrow M - M_A = \cancel{M_A} - \cancel{M_A} \quad \text{также}$$

$$\Rightarrow \text{CaO} - Na_2PO_4 \quad \checkmark$$

(10)

$$1\rho - \rho \quad \omega(Mg_3Na_2) \approx \frac{3,18\text{r}}{100\text{r}} = 3,18\%$$

$$C(Mg_3Na_2) \approx 0,02 \cancel{0,2} \text{ M}$$

$$2\rho - \rho \quad \omega(Mg_3Na_2) = 3,18\% \quad C = 0,2 \text{ M} \quad - \text{нужное значение!}$$

$$\omega(Mg_2Na) = 1,61\% \quad C = 1,4 \text{ M}$$