


№ 5.



Решение:
 Так как $\triangle ABD$ — прямоугольный, $\Rightarrow DM = AM = BM$, $\Rightarrow \angle MDA = \alpha$, $\Rightarrow \angle DMN = 2\alpha$
 Аналог. $\angle DNM = 2\beta$

0

60

Выход 11⁵³ 0-4 11⁵⁷

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



904

1	2	3	4	5	6	сумма
4	4	0	0	0	4	12

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА
 ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ
 2018–2019

заключительный этап

Предмет (комплекс предметов) Олимпиады МАТЕМАТИКА (8–9 КЛАССЫ)

Город, в котором проводится Олимпиада Санкт-Петербург

Дата 13.03.2019

8–9 КЛАСС. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

1. Маша на свой день рождения принесла в школу конфеты, оставила несколько конфет себе, а остальные раздала шестерым своим подружкам. Оказалось, что у всех девочек разное число конфет и количество конфет у любых четырех девочек больше, чем у трех оставшихся. Какое наименьшее количество конфет Маша могла оставить себе?
2. При каких a квадратные трехчлены $x^2 + ax - 2$ и $2x^2 - 3x + 2a$ имеют общий корень?
3. На столе лежит 2019 камней. Петя и Вася играют в игру по следующим правилам. Ходят по очереди, начинает Петя. За один ход можно взять со стола 1 или 2 камня, но один и тот же игрок два раза подряд не может брать 2 камня. Проигрывает не имеющий хода. Кто из игроков сможет обеспечить себе победу вне зависимости от игры противника?
4. Для любых положительных чисел a, b и c докажите неравенство

$$\frac{a}{2a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b}{a^2 + 2b^2 + c^2} + \frac{c}{a^2 + b^2 + 2c^2} \leq \frac{9}{4(a + b + c)}$$
5. Внутри треугольника ABC выбрана такая точка D , что $\angle ABD = \angle ACD$ и $\angle ADB = 90^\circ$. Точки M и N середины сторон AB и BC соответственно. Найдите угол $\angle DNM$.
6. Найдите все пары простых чисел p и q , для которых $p^2 + pq + q^2$ является точным квадратом.

12.
Пусть у этих девочек конфект $a_1, a_2, \dots, a_n: a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 > a_5 + a_6 + a_7$, но $a_7 \geq a_6 + 1 \geq a_5 + 2 \geq a_4 + 3 \geq a_3 + 4 \geq a_2 + 5$,
м.е. $a_7 \geq a_1 + 3, a_6 \geq a_3 + 3, a_5 \geq a_2 + 3$.

III. к. нам нужно для Миним наименьшее, то у Миним а конфект.
М.е. Миним могла оставить себе не меньше 10 конфект.

Пример: Кат-во не конфект у девочек: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Все условия выполняются.
Ответ: 10.

13.
$$\begin{cases} x^2 + ax - 2 = 0 \\ 2x^2 - 3x + 2a = 0 \end{cases} \quad x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

$$x_{3,4} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 16a}}{4} \quad 9 - 16a \geq 0, \text{ м.е. } a \leq \frac{9}{16}$$

$$x^2 + ax - 2 = 2x^2 - 3x + 2a$$

$$x^2 - x(a+3) + 2(a+1) = 0$$

По м. Булема $x_1 = a+1, x_2 = 2$.
III. е. $\begin{cases} (a+1)^2 + a(a+1) - 2 = 0 \\ 4 + 2a - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a^2 + 3a + 1 \\ a + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+8}}{2} \\ a = -1 \end{cases}$
$$\frac{-3 - \sqrt{17}}{4} < \frac{9}{16}, \text{ м.к. } \frac{9}{16} > 0, \text{ а } \frac{-3 - \sqrt{17}}{4} < 0, \text{ аналогично для } a = -1.$$

$$\frac{-3 + \sqrt{17}}{4} < \frac{9}{16}, \text{ м.к. } \Leftrightarrow 4\sqrt{17} < 21 \Leftrightarrow 272 < 441 - \text{ верно.}$$

III. е. это выполняется при $a = -1; \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$
Ответ: Три $a = -1; \frac{-3 - \sqrt{17}}{4}; \frac{-3 + \sqrt{17}}{4}$.

14.
Пусть $p^2 + qp + q^2 = x^2$, где $x \in \mathbb{N}$
 $p^2 + qp + q^2 = (p+q)^2 - pq = x^2$
 $(p+q)^2 - x^2 = pq$, м.е. $p+q > x$ и пусть, не уменьшая общности $q > p$.
 $(p+q-x)(p+q+x) = pq$, м.е. $p+q+x > p+q-x \Rightarrow \begin{cases} p+q-x = p \\ p+q+x = q \\ p+q-x = 1 \\ p+q+x = pq \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = x - \text{ или } \\ p = -x - \text{ верно} \\ p+q = x+1 \\ p+q = pq-x \end{cases}$

$p = x+1 - q$, м.е. $p^2 + qp + q^2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 + q^2 + 1 - 2qx - 2q + 2x + 2q + q - q^2 + q^2 = x^2$
 $q^2 + 1 - 2qx - q + 2x = 0$
 $x = \frac{q^2 - q + 1}{q - 2} = \frac{q^2 - 2q + q + 1}{q - 2} = q + \frac{q+1}{q-2}$, м.е. $q+1: q-2$. Пусть $q+1 = k(q-2)$
 $q(k-1) = 2k+1 \Rightarrow q = \frac{2k+1}{k-1}$, м.е. $2k+1: k-1$.

$\frac{2k+1}{k-1} = \frac{2k-2+3}{k-1} = \frac{3}{k-1} + 2$, м.е. $3: k-1$, м.е. $\begin{cases} k-1 = -3 \\ k-1 = -1 \\ k-1 = 1 \\ k-1 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -2 - \text{ не подходит} \\ k = 0 - \text{ не подходит} \\ k = 2 \\ k = 4 \end{cases}$
 $q = \frac{2k+1}{k-1}$, м.е. $q_1 = 3; q_2 = 5$.
 $x = q + \frac{q+1}{q-2}$. $x_1 = 3 + \frac{4}{1}; x_2 = 5 + \frac{6}{3}$, м.е. $x = 7$.

$p_1 = x+1 - q_1 = 8 - 3 = 5, p_2 = x+1 - q_2 = 3$.
III. е. единственная подходящая пара — 3 и 5: $9 + 15 + 25 = 49 = 7^2$.
Ответ: 3 и 5.

14.
$$\frac{a}{20^2 + b^2 + c^2} + \frac{b}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{c}{a^2 + b^2 + 2c^2} \leq \frac{a}{\sqrt{ab^2c^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2bc}} + \frac{c}{\sqrt{a^2bc^2}} = \frac{1}{\sqrt{bc}} + \frac{1}{\sqrt{ac}} + \frac{1}{\sqrt{ab}} =$$

$$= \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2}{\sqrt{abc}} \leq \frac{9}{4(a+b+c)}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \leq \frac{3}{2} \sqrt{a+b+c}$$

$$\frac{2(a+b+c)(a+b+c)}{\sqrt{abc}} \leq 9$$

$$\frac{2\sqrt{abc} \cdot \sqrt{abc}}{\sqrt{abc}} = \frac{2 \cdot \sqrt{ab^2c^2} \cdot \sqrt{abc}}{\sqrt{abc}} = \frac{2\sqrt{abc}}{\sqrt{abc}} = 2 \leq 9 - \text{ верно.}$$



15.
Тема первого урока будет 1, и затем поддерживает четность кат-во оставшаяся камнями. В конце после его хода будет ~~х.б.х.~~ ~~возможно сделать 3.~~ Тогда как бы ни ходил Вася, тема выигрывает.
и.т.д.